

Radiologie & Nucleaire
geneeskunde

Mammabiopsie met behulp van röntgenfoto's (Stereotactische biopsie)

Bij een stereotactische biopsie worden stukjes weefsel (biopten) weggenomen uit een afwijking in de borst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van röntgenbeelden om de precieze plaats van de afwijking te bepalen. Het weggenomen weefsel wordt daarna onderzocht in het laboratorium, om na te gaan of er eventuele kwaadaardige cellen aanwezig zijn.

De stereotactische biopsie wordt gedaan op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde in Sneek.

Vorbereiding

- Als u medicijnen gebruikt die uw bloed verdunnen, moet u daarmee soms tijdelijk stoppen.
 - Als u al op de Mammapoli bent geweest, is dit met u besproken door de chirurg.
 - Als u nog niet op de Mammapoli bent geweest, is dit met u besproken bij het maken van uw afspraak.

Als u hierover nog vragen hebt, kunt u bellen met de polikliniek Chirurgie. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:00 uur. T: 0515 - 48 89 81 .

- Gebruik voor het onderzoek geen bodylotion of crème op uw borst. U mag wel deodorant gebruiken.
- Neem iemand mee naar het ziekenhuis voor vervoer en ondersteuning. Uw begeleider kan niet bij het onderzoek zijn.
- Draag op de dag van het onderzoek een stevige, goed zittende beha. Zo krijgt uw borst na het onderzoek genoeg ondersteuning.

Het onderzoek

U moet zich voor de afspraak aanmelden bij 1 van de zuilen in de centrale hal, met uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U krijgt een ticket waarop staat hoe laat u de afspraak hebt en welk routenummer u moet volgen. U kunt daar in de wachtruimte gaan zitten. Een laborant roept u op. Het onderzoek wordt gedaan door een radioloog en 2 laboranten. De kleding op het bovenlichaam moet u uitdoen.

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel of ligt u op uw linker- of rechterzij op een onderzoekstafel. Het is erg belangrijk dat uw borst niet beweegt tijdens het onderzoek. Daarom wordt uw borst ingeklemd tussen 2 platen.

Er worden verschillende röntgenfoto's gemaakt. Met behulp van die foto's kan de plaats van de afwijking in de borst precies worden bepaald. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving. Nadat de verdoving goed is ingewerkt, maakt de radioloog een sneetje in de huid en brengt hierdoor een naald in. Dit kan gevoelig zijn, vooral als de afwijking diep zit. Er worden controlefoto's gemaakt om te zien of de naald in de afwijking zit. Als dat zo is, worden via de naald verschillende stukjes borstweefsel weggenomen. Op de plek van de afwijking wordt een marker achtergelaten. Dat is een klein staafje van titanium dat zichtbaar is op de mammografie, echografie en MRI. Hierdoor kan de biopsieplek altijd worden teruggevonden bij eventuele latere controles. Van de marker hebt u geen last en deze kan probleemloos blijven zitten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 45 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

- Het wondje wordt met een pleister afgeplakt. Deze pleister kunt u na 24 uur zelf verwisselen of weghalen. U kunt zich daarna wassen of douchen.
- Er kan een kleine bloeditstorting zichtbaar zijn.
- Het is verstandig om na het onderzoek rustig aan te doen. Om de borst te ontsien, moet u zich de eerste 24 uur niet te veel inspannen.
- Draag tot 24 uur na de biopsie een stevige beha om eventuele bloedingen te voorkomen. Deze kunt u ook 's nachts aanhouden.
- U kunt paracetamol gebruiken tegen de pijn, maximaal 4 keer per dag 1000 mg.
- De borst kan blauwe plekken hebben en wat opzwellen. Om de bloeditstorting tegen te gaan, kunt u ijsblokjes in een plastic zakje of ijspakkingen uit de diepvries in een doek draaien en op uw borst leggen.
- Als de wond bloedt, druk dan 5 tot 10 minuten met een schone doek stevig op de wond.

Omdat het afgenomen weefsel wordt onderzocht in een laboratorium, kan de uitslag niet direct met u worden besproken. Bij het maken van de afspraak voor een stereotactisch biopt hebt u ook een afspraak gekregen voor het bespreken van de uitslag met de chirurg of de verpleegkundig specialist. Een half uur voor uw bezoek aan de chirurg of de verpleegkundig specialist wordt er op de afdeling Radiologie nog een controlefoto gemaakt van de geplaatste marker.

Schadelijkheid

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt het gebruik zoveel mogelijk beperkt. Als u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeeft. Afhankelijk van de reden voor dit onderzoek wordt het dan aangepast of uitgesteld.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie, die u van uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het kan zijn dat uw onderzoek iets anders verloopt.

Contact

Kunt u niet naar de afspraak komen? Bel dan de afdeling Radiologie en Radiologie & Nucleaire geneeskunde.

Maandag tot en met vrijdag van **8:00 tot 12:00** en van **12:45 tot 16:15** uur.
T: 0515 - 48 85 20.

Hebt u vragen? Bel dan de verpleegkundig consulent Mammacare.
Maandag tot en met vrijdag van **9:00 tot 9:30** en van **13:00 tot 13:30** uur.
T: 0515 - 48 83 70.

Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?

Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl