Radiologie & Nucleaire geneeskunde

Röntgenonderzoek van de endeldarm

Defaecografie



antonius
zorg die meebeweegt

Met een röntgenonderzoek van de endeldarm (defaecografie) wordt het laatste deel van de dikke darm zichtbaar gemaakt met röntgenstralen en contrastmiddelen.

Het onderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde in Sneek.

Voorbereiding

- Als u (misschien) zwanger bent, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeeft. Afhankelijk van de reden voor dit onderzoek wordt het aangepast of uitgesteld.
- Uw darmen moet voor dit onderzoek leeg zijn. Daarom moet u een dieet volgen en laxeermiddelen gebruiken.

Recept laxeermiddelen
U hebt van uw specialist een recept gekregen voor laxeermiddelen:
2 x 15 g magnesiumsulfaat en 4 x 5 mg Bisacodyl tabletten.
U kunt deze medicijnen met dit recept ophalen bij:

- **Sneek**: Apotheek Servicepunt in de centrale hal.
- **Emmeloord**: de centrale balie.

Dieet
U volgt op de dag voor uw onderzoek het volgende dieet:

Voor het ontbijt
Neem 50 ml magnesiumsulfaat (potje vullen met water) en 2 tabletten Bisacodyl in.

- **Ontbijt**
  1 of 2 gekookte eieren.
  1 snee witbrood met jam (zonder pitjes of schilletjes).

- **Lunch**
  1 kop heldere magere bouillon (geen cup-a-soup).
  1 portie gekookte kip of vis (zonder vel) met een glas water. Kruiden of zout zijn toegestaan.
  1 portie waterijs.

- **Avondmaaltijd**
  1 kop heldere magere bouillon (geen cup-a-soup).
  1 portie waterijs.

- **2 uren na de avondmaaltijd**
  Neem 50 ml magnesiumsulfaat (potje vullen met water) en 2 tabletten Bisacodyl in.

Tussen de maaltijden door:
U mag niets eten, maar moet wel veel drinken: minimaal 3 liter heldere dranken. Heldere dranken zijn: water, bouillon, koffie en thee (zonder melk), heldere vruchtensappen zoals appel- of druivensap en limonadesiroop.

Niet toegestaan zijn:
Dranken met koolzuur (prik), melk en melkproducten, aardappelen, groente en fruit.

Diarree
Door de voorbereiding kunt u diarree krijgen. Die kan al 3 uur na het innemen van de laxeermiddelen beginnen. Blijf daarom vanaf die tijd in de buurt van een toilet. Ook kan het handig zijn wat extra kleding mee te nemen naar het ziekenhuis, zodat u zich kunt verschonen.

Medicijnen
De medicijnen die u normaal gebruikt, kunt u nu ook innemen. Doe dat wel minimaal 30 minuten voor het innemen van de laxeermiddelen (magnesiumsulfaat en Bisacodyl). Het kan zijn dat de anticonceptiepil door de diarree minder goed werkt.

Nuchter blijven (niet eten en drinken)
Op de dag van het onderzoek mag u niet ontbijten. U mag wel drinken: een kopje thee (zonder melk).

Diabetes
Als u diabetes (suikerziekte) hebt, wilt u dit dan melden aan de laborant bij het begin van het onderzoek? Als u insuline gebruikt, kunt u voor het onderzoek de halve dosering spuiten, maar mag u nog niet eten. Na het onderzoek kunt u de andere helft spuiten en mag u weer eten.

Het onderzoek
Het onderzoek duurt totaal ongeveer 90 minuten. U drinkt eerst een contrastmiddel en na 60 minuten begint het onderzoek.

Eerste deel (drinken)
Nadat u zich gemeld hebt, kunt u in de wachtruimte gaan zitten. U wordt opgeroepen door een laborant. U krijgt 0,5 liter bariumpap te drinken. Dit contrastmiddel zorgt ervoor dat de dunne darm goed te zien is op de röntgenbeelden.

Tweede deel (rön**tgenonderzoek)**
Na ongeveer een uur wordt u weer opgeroepen door de laborant.
Tijdens het onderzoek mag u alleen een hemd of t-shirt aan. U komt op uw rug op een kantelbare röntgentafel te liggen. Met een slangetje wordt via de anus bariumvloeistof ingebracht. Daarna komt u rechtop te zitten op een röntgentoilet. Er worden foto's gemaakt in rust en terwijl u de pap uitperst. Het onderzoek is niet pijnlijk.
De vloeistof kan wel het gevoel geven dat u nodig naar het toilet moet.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u naar het toilet, waar u zich ook kunt opfrissen. U mag weer alles eten en drinken.

De radioloog beoordeelt de beelden en maakt een verslag voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Uw arts heeft u voor het onderzoek doorgegeven wanneer en hoe u de uitslag te horen krijgt.

Schadelijkheid
Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt het gebruik zoveel mogelijk beperkt.

Contact
De afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur en van 12:45 uur tot 16:15 uur.
T: 0515 - 48 85 20.

Tot slot
Deze folder geeft algemene informatie. Het kan zijn dat uw onderzoek iets anders verloopt dan is beschreven.

Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl

www.mijnantonius.nl

13-03-2023